

SARCOMEN

Temozolomide – Irinotecan

Schema

- Temozolomide 100 mg/m² PO d1 + d2 + d3 + d4 + d5
- Irinotecan 50 mg/m² IV d1 + d2 + d3 + d4 + d5 (infusie over 90 min in 250 mL glucose 5%)
- q3w
- Supportieve medicatie:
 - Ondansetron 8mg PO op d1 + d2 + d3 + d4 + d5 (30 min voor temozolomide inname)
 - Dexamethasone 10mg IV op d1 + d2 + d3 + d4 + d5
 - Dexamethasone 8mg PO op d6 + d7
 - Atropine 0.25mg SC op d1 + d2 + d3 + d4 + d5

Opmerkingen

- Temozolomide is beschikbaar als tabletten van 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 180 mg en 250 mg
- Niet breken of kauwen, op nuchtere maag in te nemen.
- Bij braken na inname geen nieuwe dosis, bij vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in te nemen.

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, hoofdpijn, acute cholinerg syndroom, PJP-infecties, rhinitis, spierzwakte
- Gastro-intestinaal: nausea en braken, diarree, constipatie, abdominale pijn, hepatotoxiciteit, anorexie, orale mucositis
- Hematologisch: anemie, neutropenie, thrombopenie
- Dermatologisch: rash (zelden urticarieel), xerostomie, partiele alopecie,
- Pulmonale toxiciteit

Dosisaanpassingen

- Leverfunctiestoornissen:
 - Bilirubine > 3x ULN: geen irinotecan