

## DERMATOLOGISCHE ONCOLOGIE

### Ipilimumab – Nivolumab FLIP

#### Schema

- Nivolumab 3 mg/kg IV d1 (infusie over 30 min in 100 mL NaCl 0.9%)
- Ipilimumab 1 mg/kg IV d1 (infusie over 30 min in 100 mL NaCl 0.9%)
- q3w gedurende 4 cycli

#### Opmerkingen

- Enkel te gebruiken bij frêle patiënten
- Immunotherapie startbilan te doen voor start
- TSH elke keer controleren

#### Nevenwerkingen

- Auto-immune toxiciteit.: kan ontstaan op elk tijdstip (meestal de eerste zes maanden)
- Vermoeidheid, jeuk, rash, thyroiditis, hypothyroidie, diabetes mellitus type 1, hypofysitis, hepatitis, colitis, gastritis, nefritis, pneumonitis, myocarditis
- Verminderde eetlust, nausea, gewichtsverlies
- Elke mogelijke andere auto-immunreactie is mogelijk, incl. nieuw ontstaan of verergeren van onderliggende auto-immuunziekten (reumatologisch, systeemziekten, neurologisch, endocrinologisch etc)

#### Dosisaanpassingen

- Immuungerelateerde nevenwerkingen ([Introduction BSMO ImmunoManager - BSMO](#))
- Geen dosisaanpassingen bij verminderde cardiale, lever- of nierfunctie

#### Belangrijke medicamenteuze interacties

- Systemische corticoiden of immunosuppressiva kunnen de werkzaamheid verminderen