

## DERMATOLOGISCHE ONCOLOGIE

### Sonidegib

#### Schema

- Sonidegib 200mg 1x/d continu (verpakking 30 stuks)

#### Opmerkingen

- Nuchter in te nemen: 1u voor of 2u na de maaltijd
- Indien inname vergeten > 6u na gepland tijdstip: dosis niet meer inhalen

#### Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, pijn, alopecia, gewichtsafname, dehydratatie
- Gastro-intestinaal: anorexie, dysgeusie, nausea, braken, buikpijn, diarree, dyspepsie, obstipatie, gastro-oesofageale refluxziekte
- Hematologisch: anemie, lymfocytopenie
- Neurologisch: hoofdpijn.
- Musculoskeletaal: spierspasmen, spierpijn, myopathie
- Gynaecologisch: amenorroe
- Dermatologisch: jeuk, huiduitslag, abnormalie haargroei
- Biochemisch: stijging amylase, creatinine, creatinekinase, glucose, lipase, ALAT en ASAT

#### Dosisaanpassingen

- Indien dosisreductie sonidegib noodzakelijk: inname 200mg om de andere dag

#### Belangrijke medicamenteuze interacties

- CYP3A substraat, cave associatie met statines (rhabdomyolyse)