

## GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

# Carboplatin – Gemcitabine – Bevacizumab

### Schema

- Bevacizumab 15mg/kg IV d1 (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
  - Eerste toediening: over 90 min
  - Tweede toediening: over 60 min
- Carboplatin AUC 4 d1 (infusie over 60 min in 250mL glucose 5%)
  - Maximale dosis 600mg (maximale klaring 125 mL/min)
- Gemcitabine 1000 mg/m<sup>2</sup> IV d1 + 8 (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Supportieve medicatie
  - Akynzeo 300/0.5mg PO d1 (1u voor chemo)
  - Dexamethasone 10mg IV d1 + d8

### Opmerkingen

- Bevacizumab
  - Proteïnurie nagaan voor toediening via dipstick
  - Bloeddruk strikt opvolgen
  - Te pauzeren bij heelkunde
    - Stop 4-6 weken voor majeure chirurgie
    - Stop 1 week voor kleinere heelkunde
  - Contra-indicaties: arteriële trombose

### Nevenwerkingen

- Algemeen: haarverlies, vermoeidheid, griepaal gevoel
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie, zeldzaam TTP
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, abdominale pijn, constipatie, diarree
- Hypocalcemie, - magnesiëmie, kaliëmie, en natremie
- Stijging leverenzymes
- Bevacizumab
  - Hypertensie, proteïurie, vertraagde wondheling
  - Arteriële trombose (zeker bij patiënten > 65j met voorgeschiedenis van arteriële trombose)
  - Bloeding, fistulisatie, perforatie
  - Zeldzaam: episode van reversibel posterior leukoencefalopathiesyndroom (RPLS)

### Dosisaanpassingen

- Beperking leverfunctie
  - Bilirubine > 1.5 ULN: reduceer gemcitabine met 25%