

GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

Carboplatin – Bevacizumab

Schema

- Bevacizumab 15 mg/kg IV (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
 - Eerste toediening over 90 min
 - Tweede toediening over 60 min
- Carboplatin AUC 6 IV (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
 - Maximale dosis 900mg (maximale klaring 125mL/min)
- q3w
- Supportieve medicatie
 - Akynzeo 300/0.5mg PO
 - Dexamethasone 10mg IV

Opmerkingen

- Bevacizumab
 - Proteïnurie nagaan voor toediening via dipstick
 - Bloeddruk strikt opvolgen
 - Te pauzeren bij heelkunde
 - Stop 4-6 weken voor majeure chirurgie
 - Stop 1 week voor kleinere heelkunde
 - Contra-indicaties: arteriële tromboses

Nevenwerkingen

- Bevacizumab
 - Hypertensie, proteïnurie, vertraagde wondheling
 - Arteriële thrombose (zeker bij patiënten > 65j met voorgeschiedenis van arteriële thrombose)
 - Bloeding, fistulisatie, perforatie
 - Zeldzaam: Episode van reversibel posterior leukoencefalopathiesyndroom (RPLS)
- Carboplatin
 - Algemeen: vermoeidheid, pijn
 - Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
 - Gastro-intestinaal: nausea, braken, abdominale pijn, constipatie, diarree
 - Hypocalcemie, - magnesiëmie, kaliëmie, en natremie
 - Stijging leverenzymes