

## GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

# Carboplatin – Paclitaxel – Dostarlimab

### Schema

- Dostarlimab 500mg IV (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
- Paclitaxel 175mg/m<sup>2</sup> IV (infusie over 3 uur in 500mL glucose 5%)
- Carboplatin AUC 5 IV (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
  - Maximale dosis 750mg (maximale klaring 125 mL/min)
- q3w gedurende 6 cycli, daarna dostarlimab monotherapie 1000mg IV q6w verder
- Supportieve medicatie
  - Cetirizine 10mg PO
  - Akynzeo 300/0.5mg PO
  - Dexamethasone 20mg IV (1u voor paclitaxel)

### Opmerkingen

- Enkel indien MMRd
- Immunotherapie startbilan bloedname voor start
- TSH elke keer opvolgen

### Nevenwerkingen

- Gastrointestinaal: anorexia, nausea, braken, mucositis, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Neurotoxiciteit, nefrotoxiciteit, vochtretentie, tranende ogen, nagel toxiciteit
- Haarverlies
- Spierpijn, hoofdpijn
- Dostarlimab:
  - Infuus gerelateerde nevenwerkingen
  - Immuuntoxiciteit ([Introduction BSMO ImmunoManager - BSMO](#))

### Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
  - Als bilirubine 1.5- 2 ULN: 25% reductie paclitaxel
  - Als bilirubine 2 – 5 ULN: 50% reductie paclitaxel
  - Als bilirubine > 5 ULN: geen paclitaxel