

## GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

# Topotecan – Bevacizumab

### Schema

- Bevacizumab 15mg/kg IV q3w (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
  - Eerste toediening over 90 min
  - Tweede toediening over 60 min
- Topotecan 4mg/m<sup>2</sup> IV q1w (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
- Supportieve medicatie
  - Dexamethasone 10mg IV

### Opmerkingen

- Bevacizumab
  - Proteïnurie nagaan voor toediening via dipstick
  - Bloeddruk strikt opvolgen
  - Te pauzeren bij heelkunde
    - Stop 4-6 weken voor majeure chirurgie
    - Stop 1 week voor kleinere heelkunde
  - Contra-indicaties: arteriële trombose

### Nevenwerkingen

- Topotecan
  - Algemeen: vermoeidheid, haarverlies, pijn, hypersensitiviteitsreactie
  - Gastrointestinaal: anorexie, nausea, braken, diarree, abdominale pijn, constipatie, intestinale obstructie
  - Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
  - Stijging van de leverenzymen
  - Dyspneu, pneumonie
- Bevacizumab
  - Hypertensie, proteiurie, vertraagde wondheling
  - Arteriële trombose (zeker bij patiënten > 65j met voorgeschiedenis van arteriële trombose)
  - Bloeding, fistulisatie, perforatie
  - Zeldzaam: Episode van reversibel posterior leukoencefalopathiesyndroom (RPLS)

### Dosisaanpassingen

- Nierinsufficiëntie:
  - eGFR 45-60 mL/min: reduceer dosis topotecan met 20%
  - eGFR 30-45 mL/min: reduceer dosis topotecan met 25%
  - eGFR <30 mL/min: reduceer dosis topotecan met 30%