

HOOFD-HALS TUMOREN

Carboplatin – Fluorouracil – Cetuximab

Schema

- Cetuximab op d1 + d8 + d15
 - Cyclus 1: 400 mg/m² IV laaddosis (infusie over 2 uur in 250mL NaCl 0.9%)
 - Vanaf cyclus 2: 250 mg/m² IV (infusie over 1 uur in 250mL NaCl 0.9%)
- Carboplatin AUC 5 IV op d1 (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
 - Maximale dosis 750mg (maximale klaring 125mL/min)
- 5-FU infusor 4000 mg/m² IV q3w op d1 (infusie over 4 dagen in 192 mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Supportieve medicatie
 - Cetirizine 10mg PO 1 uur voor cetuximab op d1 + d8 + d15
 - Akynzeo 300/0.5mg PO 1 uur voor chemotherapie
 - Dexamethasone 10mg IV

Opmerkingen

- DPD deficiëntie nagaan
- Steeds profylactisch metronidazole crème en minocycline 100mg per dag starten
- Conservatieve maatregelen: zonnebescherming, wassen met lauw water en doucheolie, hydraterende crème.
- Bij huidtoxiciteit:
 - Cefuroxime 500mg 2dd. Voor *S. aureus* surinfectie.
 - Jeuk: cetirizine
 - Xerose: vochtinbrengende crème
 - Eczeem: zwakke topische steroïden
 - Fissuren: Propyleenglycol 50% in water, 30 minuten onder occlusie, 4dd., Salicylzuur 10% 4dd.
 - Paronychia: antiseptische badjes, sterke corticoïden, antiseptica en antifungale middelen 2dd.
- Acneiforme rash: Minocycline verhogen naar 200mg, metronidazole crème tot 5dd.,

Nevenwerkingen

- Gastrointestinaal: nausea, braken, abdominale pijn
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Haarverlies, vermoeidheid, pijn, infusie-gerelateerde reactie, hypersensitiviteit
- Cardiovasculair: coronaire spasmen, ECG afwijkingen (5FU-gerelateerd)
- Stijging van leverenzymes, nierfunctie-achteruitgang
- Biochemisch: daling serum calcium / magnesium / kalium / natrium
- Acneiforme huidrash, paronychia, hypertrichosis, teleangiectasia
- Hypomagnesiëmie (cave orale substitutie niet zinvol, enkel IV)

Dosisaanpassingen

- Bilirubine > 5mg/dL: geen 5-FU