

HOOFD-HALS TUMOREN

Cetuximab

Schema

- Cetuximab 500 mg/m² IV q2w (of 400 mg/m² laaddosis gevolgd door 250 mg/m² q1w)
 - Cyclus 1: infusie over 2u in 250mL NaCl 0.9%
 - Cyclus 2 en verder: infusie over 1u in 250mL NaCl 0.9%
- Supportieve medicatie
 - Cetirizine 10mg PO d1 1u voor start

Opmerkingen

- Steeds profylactisch metronidazole crème en minocycline 100mg per dag starten
- Conservatieve maatregelen: zonnebescherming, wassen met lauw water en doucheolie, hydraterende crème.
- Bij huidtoxiciteit:
 - Cefuroxime 500mg 2dd. Voor *S. aureus* surinfectie.
 - Jeuk: cetirizine
 - Xerose: vochtinbrengende crème
 - Eczeem: zwakke topische steroïden
 - Fissuren: Propyleenglycol 50% in water, 30 minuten onder occlusie, 4dd., Salicylzuur 10% 4dd.
 - Paronychia: antiseptische badjes, sterke corticoïden, antiseptica en antifungale middelen 2dd.
 - Acneiforme rash: Minocycline verhogen naar 200mg, metronidazole crème tot 5dd.,

Nevenwerkingen

- Acneiforme huidrash, paronychia, hypertrichosis, teleangiectasia
- Hypomagnesiemia (cave orale substitutie niet zinvol, enkel IV)