

HOOFD-HALS TUMOREN

Cisplatin – Paclitaxel

Schema

- Paclitaxel 175mg/m² IV (infusie over 3 uur in 500mL glucose 5%)
- Cisplatin 75mg/m² IV (infusie over 1 uur in 500mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Prehydratatie: 1L NaCl 0.9% IV over 2u voorspoelen en 1L NaCl 0.9% IV over 2u naspoelen
- Supportieve medicatie
 - Cetirizine 10mg PO 1 uur voor paclitaxel op d1
 - Akynzeo 300/0.5mg PO 1 uur voor paclitaxel op d1
 - Dexamethasone 20mg IV
 - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3 + d4
 - Olanzapine 5mg PO op d1 + d2 + d3 + d4

Opmerkingen

- Audiometrie voor start behandeling
- CAVE IV contrast

Nevenwerkingen

- Neuropathie, ototoxiciteit, nefrotoxiciteit (vermijd NSAID)
- Gastrointestinaal: nausea, braken, diarree, stomatitis
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Alopecie, vermoeidheid, nageltoxiciteit, oedeem, hypotensie, ECG veranderingen
- Stijging van leverenzymen
- Hypersensitiviteitsreacties
- Spierpijn, gewrichtspijn

Dosisaanpassingen

- Nierinsufficiëntie:
 - eGFR 45-60: reduceer dosis cisplatin met 25%
 - eGFR 30-45: reduceer dosis cisplatin met 50%
 - eGFR <30: geen cisplatin
- Leverinsufficiëntie
 - Als bili 1.5- 2 ULN: 25% reductie paclitaxel
 - Als bili 2 – 5 ULN: 50% reductie paclitaxel
 - Als bili >5: geen paclitaxel