

HOOFD-HALS TUMOREN

Docetaxel – Cisplatin – Fluorouracil

Schema

- Docetaxel 75mg/m² IV (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
- Cisplatin 75mg/m² IV (infusie over 1 uur in 500mL NaCl 0.9%)
- 5-FU infusor 3750 mg/m² IV (infusie over 5 dagen in 240 mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Prehydratatie: 1L NaCl 0.9% IV over 2u voorspoelen en 1L NaCl 0.9% IV over 2u naspoelen
- Supportieve medicatie
 - Akynzeo 300/0.5mg PO 1 uur voor chemotherapie
 - Dexamethasone 20mg IV op d1
 - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3 + d4
 - Olanzapine 5mg PO op d1 + d2 + d3 + d4
 - Pegfilgrastim 6mg SC 24u na einde 5-FU infusor
 - Ciprofloxacin 500mg 2x/d PO d5 – d15 (via thuisapotheek voorschrijven)

Opmerkingen

- Toe te dienen via opname
- Audiometrie voor start behandeling
- CAVE IV contrast
- DPD deficiëntie nagaan
- Gebruik van koelsysteem handen

Nevenwerkingen

- Neuropathie, ototoxiciteit, nefrotoxiciteit (vermijd NSAID)
- Gastrointestinaal: nausea, braken
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Haaruitval, vermoeidheid, vochtretentie, tranende ogen, nageltoxiciteit
- Stijging van leverenzymen
- Cardiovasculair: coronaire spasmen, ECG afwijkingen (5FU-gerelateerd)

Dosisaanpassingen

- Nierinsufficiëntie:
 - eGFR 45-60: reduceer dosis cisplatin met 25%
 - eGFR 30-45: reduceer dosis cisplatin met 50%
 - eGFR <30: geen cisplatin
- Leverinsufficiëntie
 - Bilirubine > 5mg/dL: geen 5-FU
 - Bilirubine > ULN: geen docetaxel

