

## DIGESTIEVE ONCOLOGIE

# Capecitabine – Temozolomide (CAPTEM)

### Schema

- Capecitabine 750 mg/m<sup>2</sup> PO 2x/d gedurende 2 weken, gevolgd door **2 weken** rust
- Temozolomide 200 mg/m<sup>2</sup> 1x/d PO d10 + d11 + d12 + d13 + d14 (nuchter 1u voor maaltijd)
  - Alternatief: 100 mg/m<sup>2</sup> 2x/d
- q4w
- Supportieve medicatie
  - Ondansetron 8mg PO 1x/d d10 + d11 + d12 + d13 + d14 (1u voor temozolomide)
  - Eventueel olanzapine 5 mg d10 + d11 + d12 + d13 + d14

### Opmerkingen

- DPD deficiëntie nagaan (zie SOP voor dosisaanpassing)
- Capecitabine 30 minuten na de maaltijd, interval van 12u tussen twee dosissen
- Capecitabine is beschikbaar als tabletten van 150 mg en 500 mg
- Temodal is beschikbaar als tabletten van 5 mg, 20 mg, 100mg, 140mg, 180 mg en 250 mg
- Zonnecrème aanraden

### Nevenwerkingen

- Gastro-intestinaal: mucositis, nausea, braken, anorexie, diarree
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Handvoetsyndroom (preventie met hydraterende crème, pedicure en vermijden van compressie)
- Cardiotoxiciteit (coronaire spasmen)

### Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie
  - eGFR 30-50: reduceer capecitabine met 25%
  - eGFR < 30: STOP chemotherapie