

## DIGESTIEVE ONCOLOGIE

### Carboplatin – Paclitaxel – (Radiotherapie)

#### Schema

- Cross schema (met RT)
  - Paclitaxel 50mg/m<sup>2</sup> IV (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
  - Carboplatin AUC 2 IV (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
    - Maximale dosis 300mg (maximale klaring 125mL/min)
  - 5x q1w samen met radiotherapie
- Standaard schema zonder RT
  - Paclitaxel 175 mg/m<sup>2</sup> IV (infusie over 3 uur in 500mL glucose 5%)
  - Carboplatin AUC 5 IV (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
    - Maximale dosis 750mg (maximale klaring 125mL/min)
  - q3w
- Supportieve medicatie
  - Akynzeo 300/0.5mg PO (1u voor paclitaxel)
  - Cetirizine 10mg PO (1u voor paclitaxel)
  - Dexamethasone 10mg IV (q1w schema) of 20mg IV (q3w schema) (30 min voor paclitaxel)

#### Opmerkingen

- Streefwaarde Hb 10g/dL gezien radiotherapie
- Hilotherapie bevragen

#### Nevenwerkingen

- Gastrointestinaal: anorexia, nausea, braken, mucositis, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Neurotoxiciteit, nefrotoxiciteit, vochtretentie, tranende ogen, nagel toxiciteit
- Haarverlies
- Spierpijn, hoofdpijn

#### Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
  - Als bili 1.5- 2 ULN: 25% reductie paclitaxel
  - Als bili 2 – 5 ULN: 50% reductie paclitaxel
  - Als bili >5: geen paclitaxel.