

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Cetuximab

Schema

- Cetuximab 500 mg/m² IV q2w (infusie over 1u in 250mL NaCl 0.9%)
 - Eerste cyclus infusie over 2u, max infuussnelheid 10mg/min
 - Alternatief 400 mg/m² laaddosis gevolgd door 250 mg/m² q1w
- Supportieve medicatie
 - Cetirizine 10mg PO (1u voor start)
- Combinatie met mFOLFOX, mFOLFIRI, mDeGramont

Opmerkingen

- Steeds profylactisch metronidazole crème en minocycline 100mg per dag starten
- Conservatieve maatregelen: zonnebescherming, wassen met lauw water en doucheolie, hydraterende crème.
- Bij huidtoxiciteit:
 - Cefuroxime 500mg 2dd. Voor *S. aureus* surinfectie.
 - Jeuk: cetirizine
 - Xerose: vochtinbrengende crème
 - Eczeem: zwakke topische steroïden
 - Fissuren: Propyleenglycol 50% in water, 30 minuten onder occlusie, 4dd., Salicylzuur 10% 4dd.
 - Paronychia: antiseptische badjes, sterke corticoïden, antiseptica en antifungale middelen 2dd.
 - Acneiforme rash: Minocycline verhogen naar 200mg, metronidazole crème tot 5dd.

Nevenwerkingen

- Acneiforme huidrash, paronychia, hypertrichosis, teleangiectasia
- Hypomagnesiemia (cave orale substitutie niet zinvol, enkel IV)