

## DIGESTIEVE ONCOLOGIE

# Cisplatin / Carboplatin- etoposide

### Schema

- Cisplatin 80 mg/m<sup>2</sup> IV (infusie over 1 uur in 500mL NaCl 0.9%)
- ALTERNATIEF: Carboplatin AUC 5 (infusie over 1 uur)
- Etoposide 100 mg/m<sup>2</sup> IV d1 + d2 + d3 (infusie over 1 uur in 500 ml glucose 5%)
- Q3w
- Prehydratatie d1: 1L NaCl 0.9% IV over 2u voorspoelen en 1L NaCl 0.9% IV over 2u naspoelen
- Supportieve medicatie:
  - Akynzeo d1 PO (1u voor chemo)
  - Dexamethasone 10 mg IV bolus d1 en 8 mg PO d2 + d3 + d4 (bij carbo is PO d2,3,4 niet nodig)
  - Olanzapine 5 mg PO d1 – d4
  - Pegfilgrastim 6mg SC 24u na einde chemotherapie

### Opmerkingen

- Audiometrie voor start behandeling
- CAVE IV contrast

### Nevenwerkingen

- Neuropathie, ototoxiciteit, nefrotoxiciteit (vermijd NSAID)
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, anorexie, mucositis, diarree
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Haarverlies, vermoeidheid

### Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie:
  - eGFR 45-60: reduceer dosis cisplatin met 25%
  - eGFR 30-45: reduceer dosis cisplatin met 50%
  - eGFR <30: geen cisplatin
- Beperking leverfunctie:
  - Bilirubine 1,5 – 3: 50% reductie
  - Bilirubine > 3: geen etoposide toedienen