

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Gemcitabine – Oxaliplatin (GEMOX)

Schema

- Gemcitabine 1000 mg/m² IV (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
- Oxaliplatin 100 mg/m² IV (infusie over 2u in 250mL glucose 5%)
- q2w
- Supportieve medicatie
 - Palonosetron 250µg IV op d1 (30 min voor chemo)
 - Dexamethasone 10mg IV op d1 (30 min voor chemo)
 - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3

Opmerkingen

- Contact met koude vermijden de eerste 3 dagen (geen koude dranken, roomijs, ...)

Nevenwerkingen

- Gastro-intestinaal: nausea, braken, verminderde eetlust
- Oxaliplatine-gerelateerd: neuropathie, laryngofaryngeale dysesthesie
- Gemcitabine-gerelateerd: griepaal syndroom
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Zeldzaam: TTP (gemcitabine) (opvolgen bloedplaatjes)

Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie
 - eGR 30 – 49mL/min: 25% reductie oxaliplatin
- Beperking leverfunctie
 - Bilirubine > 1.5 ULN: reduceer gemcitabine met 25%
- Acute laryngo-pharyngeale dysesthesie: geef oxaliplatin over 4 – 6u