

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Oxaliplatin – Docetaxel – 5-FU (FLOT)

Schema

- Docetaxel 50 mg/m² IV (infusie over 1u in 250mL glucose 5%)
- Levofolinezuur 200 mg/m² IV (infusie over 2u in 100mL glucose 5% - samen met oxaliplatin)
- Oxaliplatin 85 mg/m² IV (infusie over 2u in 250mL glucose 5%)
- 5FU 2600 mg/m² IV (infusie over 24u in infusor met 120mL NaCl 0.9%)
- q2w
- Supportieve medicatie
 - Palonosetron 250µg PO op d1 (30min voor chemo)
 - Dexamethasone 20mg IV op d1 (30min voor chemo)
 - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3
 - Pegfilgrastim 6mg SC (24u na einde chemo)

Opmerkingen

- DPD deficiëntie nagaan (zie SOP voor dosisaanpassing)
- Hilotherapie bevragen en toedienen bij docetaxel
- Contact met koude vermijden gedurende eerste 3 dagen (geen koude dranken, roomijs, ...)

Nevenwerkingen

- Gastro-intestinaal: mucositis, nausea, braken, anorexie, diarree
- Vermoeidheid, vochtretentie, tranende ogen, nageltoxiciteit
- Haarverlies
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Neurologisch: neuropathie, laryngopharyngeale dysesthesie
- Cardiovasculair: coronaire spasmen (5FU-gerelateerd)

Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie
 - Klaring 30 – 49: 25% reductie oxaliplatin
- Beperking leverfunctie: best geen docetaxel gebruiken bij verhoogd bilirubine
- Acute laryngo-pharyngeale dysesthesie: geef oxaliplatin over 4 – 6u