

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Raltitrexed – Oxaliplatin

Schema

- Raltitrexed 3 mg/m² IV (infusie over 15 min in 100mL glucose 5%)
- Oxaliplatin 130 mg/m² IV (infusie over 2u in 500mL glucose 5%)
- q3w
- Supportieve medicatie
 - Palonosetron 250µg IV d1 (30 min voor chemo)
 - Dexamethasone 10mg IV d1 (30 min voor chemo)
 - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3

Opmerkingen

- Contact met koude vermijden gedurende eerste 3 dagen

Nevenwerkingen

- Gastro-intestinaal: mucositis, nausea, braken, anorexie, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Neurologisch: neuropathie, laryngopharyngeale dysesthesie

Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie
 - eGFR 30-49 mL/min: reduceer oxaliplatin met 25%
 - eGFR < 30 mL/min: STOP chemotherapie
 - Raltitrexed:
 - eGFR > 65 mL/min: 100%
 - eGFR 55 – 65 mL/min: 75% q4w
 - eGFR 25 -54 mL/min: 50% q4w
- Acute laryngo-pharyngeale dysesthesie: geef oxaliplatin over 4 - 6h