

## DIGESTIEVE ONCOLOGIE

### TAS102 (Lonsurf)

#### Schema

- Trifluridine/tipiracil 35mg/m<sup>2</sup> PO 2x/d d1 t.e.m. d5 en d8 t.e.m. d12
- q4w

#### Opmerkingen

- Binnen 1 uur na het ontbijt of avondmaal met een glas water
- Vergeten of overgeslagen dosis inhalen binnen de 8u (bij het eten)
- Er bestaan tabletten van 20mg trifluridine + 8.19mg tipiracil en 15mg trifluridine + 6.14mg tipiracil
- Dosisberekening:

Startdosis	Lichaamsoppervlak (m <sup>2</sup> )	Dosis in mg (tweemaal daags)	Tabletten per dosis (tweemaal daags)		Totale dagelijkse dosis (mg)
			15 mg / 6,14 mg	20 mg / 8,19 mg	
35 mg/m <sup>2</sup>	< 1,07	35	1	1	70
	1,07 - 1,22	40	0	2	80
	1,23 - 1,37	45	3	0	90
	1,38 - 1,52	50	2	1	100
	1,53 - 1,68	55	1	2	110
	1,69 - 1,83	60	0	3	120
	1,84 - 1,98	65	3	1	130
	1,99 - 2,14	70	2	2	140
	2,15 - 2,29	75	1	3	150
	≥ 2,30	80	0	4	160

#### Nevenwerkingen

- Myelosuppressie
- Gastro-intestinaal: anorexie, diarree, nausea, braken
- Vermoeidheid

#### Dosisaanpassingen

- Maximaal 3 dosisreducties tot een minimum van 20 mg/m<sup>2</sup> 2x/d