

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

mFOLFIRI

Schema

- Levofolinezuur 200 mg/m² IV (infusie over 90 min in 100mL glucose 5%)
 - Simultaan met irinotecan
- Irinotecan 180 mg/m² IV (infusie over 90 min in 250mL glucose 5%)
- fluorouracil bolus 400 mg/m² IV (infusie over 10 minuten in 50mL NaCl 0.9%)
- fluorouracil infusor 2400 mg/m² IV over 48u (in 120mL NaCl 0.9%)
- q2w
- Supportieve medicatie
 - Atropine 0.25mg SC (10 min voor toediening irinotecan ter preventie van acuut cholinerg syndroom)
 - Palonosetron 250µg IV (30 min voor chemo)
 - Dexamethasone 10mg IV d1 (30 min voor chemo)
 - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3

Opmerkingen

- DPD deficiëntie nagaan (zie SOP voor dosisaanpassing)
- UGT1A1 deficiëntie nagaan

Nevenwerkingen

- Gastro-intestinaal: mucositis, nausea, braken, anorexie, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Haarverlies
- Cardiovasculair: coronaire spasmen (5FU)

Dosisaanpassingen

- Beperking leverfunctie
 - Ernstig (bilirubine > 3 mg/dL): STOP irinotexan