

THYMUS CARCINOOM

Gemcitabine - Capecitabine

Schema

- Gemcitabine 1000 mg/m² IV d1 + d8 + d15 (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
- Capecitabine 830 mg/m² PO d1 t.e.m. d21, gevolgd door 1 week rust
- q4w
- Supportieve medicatie
 - Dexamethasone 10mg IV d1 + d8 + d15

Opmerkingen

- Capecitabine
 - DPD deficiëntie nagaan (zie SOP voor dosisaanpassing bij deficiëntie)
 - Binnen 30 minuten na de maaltijd, interval van 12u tussen twee dosissen, niet breken of kauwen
 - Zonnecrème aanraden
 - Pillen van 500 mg en 150 mg

Nevenwerkingen

- Algemeen: griepaal syndroom, vermoeidheid
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, verminderde eetlust, mucositis
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Zeldzaam: TTP (gemcitabine) (opvolgen bloedplaatjes)

Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie
 - eGFR 30-49 mL/min: reduceer capecitabine met 25%
 - eGFR <30 mL/min: STOP capecitabine
- Beperking leverfunctie
 - Bilirubine > 1.5 ULN: reduceer gemcitabine met 25%