

GENITO-URINAIRE TUMOREN

Enfortumab vedotin

Schema

- Enfortumab vedotin 1,25 mg/kg IV op d1 + d8 + d15 (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
 - Maximale dosis 125mg
- q4w
- Supportieve medicatie
 - Dexamethasone 10mg IV op d1 + d8 + d15

Opmerkingen

- Bij wazig zicht of droge ogen: kunsttranen en kunstzalf opstarten
- Bij nausea: eventueel ondansetron of olanzapine opstarten

Nevenwerkingen

- Dermatologisch: alopecie, huiduitslag, pruritus,
- Endocrien en metabolisch: hypofosfatemie- en kaliëmie, hyperglycemie, gewichtsverlies
- Gastro-intestinaal: constipatie, abdominale pijn, anorexie, nausea, braken, diarree, smaakveranderingen, verhoogd serumlipase
- Hematologisch: anemie, neutropenie, bloeding
- Stijging AST, stijging creatinine, musculoskeletale pijn
- Zenuwstelsel: Vermoeidheid, perifere neuropathie
- Oftalmologisch: Wazig zicht, droog oog syndroom, oculaire toxiciteit

Dosisaanpassingen

- Leverfunctiestoornissen:
 - Matig tot ernstig (bilirubine > 1 - 1.5 x ULN of AST > ULN): geen enfortumab vedotin