

## THORAXONCOLOGIE

### Brigatinib

#### Schema

- Brigatinib 90 mg 1x/d PO continu (de eerste 7 dagen)
- Brigatinib 180 mg 1x/d PO (vanaf dag 8)

#### Opmerkingen

- Inname met of zonder voedsel
- Capsules van 180 mg, 90 mg en 30 mg

#### Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, koorts, asthenie, perifeer oedeem
- Gastro-intestinaal: misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, anorexie, stomatitis, dyspepsie, flatulentie
- Cardiovasculair: QTc-verlenging, hypertensie, bradycardie,
- Pulmonaal: hoest, dyspnoe, pneumonitis
- Neurologisch: hoofdpijn, duizeligheid, perifere neuropathie, slapeloosheid
- Musculoskeletaal: verhoging CK's, spierpijn,
- Nefrologisch: ionenstoornissen, verhoging van het serumcreatinine
- Dermatologisch: droge huid, jeuk, erytheem, huiduitslag.
- Hepatologisch: stijging leverenzymen, stijging pancreasenzymen
- Hematologische toxiciteit
- Andere: visusstoornissen, onaangenaam gevoel op de borst