

## THORAXONCOLOGIE

# Carboplatinum + Pemetrexed

### Schema

- Pemetrexed 500 mg/m<sup>2</sup> IV q3w (infusie over 10 min in 100 mL NaCl 0.9%)
- Carboplatinum AUC 5 IV op d1 (infusie over 60 min in 250 mL glucose 5%)
  - Maximale dosis 750 mg (maximale klaring 125 mL/min)
- q3w
- Supportieve medicatie
  - Akynzeo 300/0.5mg PO
  - Dexamethasone 10mg IV op d1 (30min voor chemotherapie)
  - Dexamethasone 8mg PO -24h, -12h, 12h, 24h, 48h, 72h

### Opmerkingen

- Volg perifere neuropathie op. Zie SOP polyneuropathie.
- Voor chemo te starten met suppletie (zo mogelijk 1 week op voorhand)
  - Foliumzuur 0.4 mg PO 1x/dag
  - Vitamine B12 1000 µg IM 1x/9 weken

### Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, overgevoelighedsreacties, rhinitis en conjunctivitis
- Gastro-intestinaal: anorexie, diarree, nausea, stomatitis, braken, smaakveranderingen
- Hematologisch: anemie, trombopenie, neutropenie
- Hepatisch: stijging leverenzymes
- Dermatologisch; huidrash, jeuk, haarverlies
- Neurologisch: perifere neuropathie
- Biochemisch: daling serum calcium / magnesium / kalium / natrium
- Nierfunctie-achteruitgang