

THORAXONCOLOGIE

Cisplatine – Vinorelbine

Schema

- Vinorelbine 25 mg/m² IV op d1 en d8 (infusie over 10 min in 140mL NaCl 0.9%, naspoeling 250mL NaCl 0.9%)
- Cisplatine 80 mg/m² IV op d1 (infusie over 2u in 500mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Prehydratatie: 1L NaCl 0.9% IV over 2u voorspoelen en 1L NaCl 0.9% IV over 2u naspoelen
- Supportieve medicatie:
 - Akynzeo 300/0.5mg PO d1 (1u voor chemo)
 - Dexamethasone 10mg IV bolus d1 en 8mg PO d2 + d3 + d4
 - Olanzapine 5mg PO d1+ d2 + d3 + d4

Opmerkingen

- Optioneel audiometrie voor start behandeling
- Volg perifere neuropathie op. Zie SOP polyneuropathie
- Opgelet met nefrotoxische medicatie (o.a. NSAIDs) en IV contrast

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, alopecie, ototoxiciteit, artralgie en myalgie
- Gastro-intestinaal: nausea en braken, mucositis, constipatie, anorexie, gestegen transaminasen
- Neurologisch: perifere neuropathie, verlies diepe peesreflexen
- Nefrologisch: nefrotoxiciteit, hypomagnesiëmie, hypokaliëmie, hypocalcemie
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Pulmonale toxiciteit

Dosisaanpassingen

- Verminderde nierfunctie:
 - eGFR 45-60 mL/min: reduceer dosis cisplatin met 25%
 - eGFR 30-45 mL/min: reduceer dosis cisplatin met 50%
 - eGFR <30 mL/min: geen cisplatin
- Hepatische dysfunctie bij start
 - Mild: reduceer vinorelbine met 25%
 - Matig: reduceer vinorelbine met 50%
 - Ernstig: geen vinorelbine