

THORAXONCOLOGIE

Dabrafenib – Trametinib

Schema

- Dabrafenib 150 mg 2x/d PO continu
- Trametinib 2 mg 1x/d PO continu

Opmerkingen

- Nuchtere inname: 2u na of 1u vóór de maaltijd met groot glas water
- Dabrafenib: capsules van 50 en 75 mg (28 stuks/verpakking)
- Trametinib: capsules van 0.5 en 2 mg (30 stuks/verpakking, te bewaren in de koelkast; eens geopend gedurende max. 30 dagen bewaren <30°C)

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, koorts, koude rillingen, asthenie, perifeer oedeem, griepig gevoel
- Gastro-intestinaal: misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, anorexie, abdominale pijn
- Cardiovasculair: hypertensie, bloedingen (waaronder intracranieële bloedingen en fatale bloedingen)
- Pulmonaal: nasofaryngitis, hoest
- Neurologisch: hoofdpijn, duizeligheid
- Musculoskeletaal: artralgie (ca. 25%), myalgie, spierspasmen, pijn in ledemaat
- Dermatologisch: droge huid, jeuk, erytheem, huiduitslag.
- Hepatologisch: stijging leverenzymen, zelden pancreatitis