

SARCOOM

Carboplatinum + Doxorubicine

Schema

- Doxorubicine 25 mg/m² IV op d1 + d2 + d3 (infusie over 10 min in 100mL NaCl 0.9%)
- Carboplatinum AUC 5 IV op d1 (infusie over 1 u in 250mL NaCl 0.9%)
 - Maximale dosis 750mg (maximale klaring 125 mL/min)
- q3w
- Supportieve medicatie
 - Akynzeo 300/0.5mg PO op d1 (1u voor chemo)
 - Dexamethasone 10mg IV op d1 + d2 + d3
 - Dexamethasone 8mg PO op d4
 - Pegfilgrastim 6mg SC 24u na einde chemotherapie

Opmerkingen

- Fotosensitiviteit: zonnecrème
- Doxorubicine maximale cumulatieve dosis 550 mg/m²
- Hartfunctie opvolgen (zie SOP cardiotoxiciteit)

Nevenwerkingen

- Algemeen: lokale 'flare' reactie (uitsluiten extravasatie), hypersensitiviteit, vermoeidheid, artralgie, myalgie
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, veranderde geur en smaak, orale mucositis
- Cutaan: fotosensitiviteit, alopecie, radiatie-recall, hyperpigmentatie, nagelveranderingen
- Hematologisch: neutropenie, anemie, thrombopenie
- Cardiotoxiciteit

Dosisaanpassingen

- Gedaalde leverfunctie
 - Bilirubine 1.2-3 mg/dL: reduceer doxorubicine met 50%
 - Bilirubine 3.1-5 mg/dL: reduceer doxorubicine met 75%
 - Bilirubine > 5mg/dL: geen doxorubicine