

SARCOOM

Dacarbazine

Schema

- Dacarbazine 800 mg/m² IV q2w (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
- Supportieve medicatie
 - Akynzeo 300/0.5mg PO op d1 (1u voor chemo)
 - Dexamethasone 10mg IV op d1
 - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3 + d4
 - Olanzapine 5mg PO op d1 + d2 + d3 + d4

Opmerkingen

- Goed naspoelen (irritatie!)
- Fototoxisch, zonnecrème

Nevenwerkingen

- Algemeen: hypersensitiviteitsreacties, griepale symptomen, lokale irritatie thv injectieplaats
- Gastro-intestinaal: anorexie, misselijkheid, braken, diarree, veno-occlusieve aandoening van de lever (VOD), verhoogde transaminasen
- Neurologisch: hoofdpijn, visusstoornissen, verwardheid, lethargie, convulsies, paresthesie in het gezicht
- Cutaan: alopecia, hyperpigmentatie, fotosensitiviteit, erytheem, maculopapulair exantheem, urticaria
- Myelotoxisch, nefrotoxisch

Dosisaanpassingen

- Gecombineerde lever- en nierinsufficiëntie: verlengde eliminatie van dacarbazine. Geen gevalideerde aanbevelingen ivm dosisvermindering.