

## SARCOMEN

### Temozolomide – Irinotecan

#### Schema

- Temozolomide 100 mg/m<sup>2</sup> PO d1 + d2 + d3 + d4 + d5 (minstens 1u voor irinotecan)
- Irinotecan 50 mg/m<sup>2</sup> IV d1 + d2 + d3 + d4 + d5 (infusie over 1u in 250 mL glucose 5%)
- q3w
- Supportieve medicatie:
  - Ondansetron 8mg PO op d1 + d2 + d3 + d4 + d5 (30 min voor temozolomide inname)
  - Dexamethasone 10mg IV op d1 + d2 + d3 + d4 + d5 (30 min voor irinotecan)
  - Atropine 0.25mg SC op d1 + d2 + d3 + d4 + d5 (vlak voor irinotecan)
  - Dexamethasone 8mg PO op d6 + d7

#### Opmerkingen

- Temozolomide is beschikbaar als tabletten van 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 180 mg en 250 mg
  - Dosis wordt afgerond naar dichtstbijzijnde 5mg
  - Niet breken of kauwen, op nuchtere maag in te nemen (1u voor of 2u na een maaltijd)
  - Capsules kunnen ook net voor toediening in fruitsap of appelmoes gedaan worden (capsules gedurende 20min laten uiteen vallen, NIET openen!)
  - Bij braken na inname geen nieuwe dosis, bij vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in te nemen
- Irinotecan: UGT1A1 deficiëntie nagaan

#### Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, hoofdpijn, acute cholinerg syndroom, PJP-infecties, rhinitis, spierzwakte
- Gastro-intestinaal: nausea en braken, diarree, constipatie, abdominale pijn, hepatotoxiciteit, anorexie, orale mucositis
- Hematologisch: anemie, neutropenie, thrombopenie
- Dermatologisch: rash (zelden urticarieel), xerostomie, partiele alopecie,
- Pulmonale toxiciteit

#### Dosisaanpassingen

- Leverfunctiestoornissen:
  - Bilirubine > 3x ULN: geen irinotecan