

SARCOOM

Trabectedine over 24 in elastomeerpomp

Schema

- Trabectedine 1.5 mg/m² IV op d1 (infusie over 24u via elastomeerpomp in 120 mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Supportieve medicatie:
 - Palonosetron 250µg IV op d1 (30 min voor chemo)
 - Dexamethasone 10mg IV op d1 (30 min voor chemo)
 - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3
 - Pegfilgrastim 6mg SC 24u na chemotherapie

Opmerkingen

- Perifere neuropathie opvolgen (zie SOP)
- Mag niet perifeer gegeven worden aan deze concentratie (indien perifeer: verdunnen in 1000mL diluent)

Nevenwerkingen

- Algemeen: hypersensitiviteit, vermoeidheid, perifere neuropathie, hoofdpijn
- Gastro-intestinaal: hepatotoxisch, nausea, braken, constipatie, anorexie, orale mucositis
- Rhabdomyolyse
- Myelotoxisch, cardiotoxisch

Dosisaanpassingen

- Beperking leverfunctie bij start
 - Bilirubine > ULN: GEEN trabectedine
- Beperking leverfunctie tijdens behandeling
 - ALT/AST > 2.5 ULN: stel uit tot herstel
 - ALT/AST > 5 ULN: stel uit tot herstel en herstart aan 1 dosislevel lager
 - Bilirubine > ULN: stel uit tot herstel en herstart aan 1 dosislevel lager
- Dosislevels

Product	Trabectedine
Startdosis	1.5 mg/m ²
Eerste dosisreductie	1.2 mg/m ²
Tweede dosisreductie	1 mg/m ²