

## GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

# Cisplatin met Radiotherapie

### Schema

- Cisplatin 40mg/m<sup>2</sup> IV (infusie over 1 uur in 500mL NaCl 0.9%)
  - q1w zolang radiotherapie loopt
- Prehydratatie: 1L NaCl 0.9% IV over 2u voorspoelen en 1L NaCl 0.9% IV over 2u naspoelen
- Supportieve medicatie
  - Akynzeo 300/0.5mg PO
  - Dexamethasone 10mg IV
  - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3
  - Olanzapine 5mg PO op d1 + d2 + d3 + d4

### Opmerkingen

- Audiometrie voor start behandeling
- CAVE IV contrast
- Streefwaarde Hb 10g/dL gezien radiotherapie

### Nevenwerkingen

- Neuropathie, ototoxiciteit, nefrotoxiciteit (vermijd NSAID)
- Gastrointestinaal: nausea, braken
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Mild haarverlies, vermoeidheid
- Stijging van leverenzymen

### Dosisaanpassingen

- Nierinsufficiëntie:
  - eGFR 45-60 mL/min: reduceer dosis cisplatin met 25%
  - eGFR 30-45 mL/min: reduceer dosis cisplatin met 50%
  - eGFR <30 mL/min: geen cisplatin