

BORSTCARCINOOM

Eribuline

Schema

- Eribulin 1.23 mg/m² IV op d1 en d8 q3w (over 10 min in 100mL NaCl 0.9%)
- Supportieve medicatie
 - Dexamethasone 10mg IV op d1 en d8 (30 min voor chemotherapie)

Opmerkingen

- Onverenigbaar met glucose 5%
- Volg perifere neuropathie op. Zie SOP polyneuropathie.
- Aandacht voor QTc-verlenging (ionenstoornissen, QTc verlengende medicatie zoals anti-emetica, ...)

Nevenwerkingen

- Algemeen: hypersensitiviteit, lokale injectiereactie, griepale klachten, hoofdpijn, geur- en smaakveranderingen, asthenie, artralgie/myalgie, vermoeidheid, perifere neuropathie, alopecie, ionenstoornissen
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, diarree orale mucositis, constipatie, anorexie
- Myelotoxiciteit, pulmonale toxiciteit, perifere oedemen

Dosisaanpassingen

- Verminderde nierfunctie:
 - eGFR 30-50 mL/min: reduceer eribuline met 25%
 - eGFR < 30mL/min: geen eribuline
- Hepatische dysfunctie bij start:
 - Mild: reduceer eribuline met 25%
 - Matig: reduceer eribuline met 50%
 - Ernstig: geen eribuline